

Inspekcja Weterynaryjna ostrzega Hodowców Drobiu przed grypą ptaków!

W związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym, kiedy następuje bardzo duża i liczna migracja dzikich ptaków, zwracamy się z prośbą o podjęcie działań mających na celu przygotowanie gospodarstw utrzymujących drób domowy (fermowy i przyzagrodowy) do zabezpieczenia przed ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków.

Grypa ptaków jest chorobą występującą u ptactwa dzikiego oraz domowego. Choć dzikie ptactwo wodne rzadko wykazuje oznaki choroby, to często przenosi wirusa grypy ptaków do środowiska. Wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwie utrzymującym drób skutkuje wdrożeniem szeregu procedur mających na celu zwalczanie tej jednostki chorobowej, a także generuje bardzo wysokie koszty oraz ograniczenia w handlu produktami pochodzenia zwierzęcego.

Jak pokazują doświadczenia zebrane w trakcie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków, najlepszą i jednocześnie najtańszą wymiarze globalnym, metodą zabezpieczenia gospodarstw jest właściwa prewencja poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji.

W ramach podejmowanych działań hodowcy drobiu, stosownie do specyfikacji gospodarstwa, powinni już teraz pomyśleć o:

- zabezpieczeniu słomy, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzywanie w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszenie itp.);
- regularnym przeglądzie wszelkich połączeń i rur (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
- eliminacji wszelkich możliwych do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych);
- w miarę możliwości powstrzymaniu się od tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne) oraz o zabezpieczeniu istniejących przed dostępem dzikiego ptactwa;
- powstrzymanie się od dokarmiania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw (karmiki);
- jeżeli na gospodarstwie znajdują się drzewa owocowe, jak najczęstsze usuwanie opadłych owoców.

Ponadto w przypadku gdy do gospodarstwa mają dostęp osoby polujące na dzikie ptactwo, należy je uświadomić, aby wszelka obróbka upolowanych zwierząt odbywała się w bezpiecznej odległości od zabudowań hodowlanych, a wszelki sprzęt i odzież zostały poddane właściwym zabiegom higienicznym.

**Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Wągrowcu**

Elżbieta Misiek